Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Factor reumatoideo

Información general

Código BK	FR
Código FONASA	305019
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	UI/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Turbidimetría
Propósito del examen	Usado en la diferenciación de artritis reumatoide y fiebre reumática
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero o plasma (EDTA o heparina)
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Estabilidad de la muestra	Temperatura ambiente: 1 día, Refrigerado: 3 días, Congelado: 6 meses
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	Centrifugue las muestras y retire el suero o plasma del material celular en un plazo de 2 horas tras la toma de muestras.

Restricciones

Hemólisis	++
Lipemia	++
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	IgG enconcentración sobre 2.500 mg/dL

Rango de referencia

Negativo, menos de 12,0 UI/mL

Método: Turbidimetría

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).