Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Mercurio en orina aislada

Información general

Código BK	MERCUOA
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	3 días hábiles
Unidad de medida	ug/g creatinina
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	Espectrometría de masa
Propósito del examen	Determinación cuantitativa de Mercurio en orina para detectar posible intoxicación.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	7 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	No ingerir agua previo a la toma de muestra
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Estabilidad de la muestra	7 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	Prohibir la ingesta de agua previa toma de muestra a lo menos 4 horas antes (mas de un litro)

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	Acido bórico (preservante)

Rango de referencia

	Edad, años	Rango, ug/g creatinina
Ambos Sexos	0 - 3	Menos de 4,5
Ambos sexos	4 - 12	Menos de 4,5
Ambos sexos	13 - 16	Menos de 3,0
Mujeres	17 o mas	Menos de 4,0
Hombres	17 o mas	Menos de 3,0
Creatinina en Orina Aislada, mg/dL		Hombres: 39,0 - 259
		Mujeres: 28,0 - 217

Cumple con Decreto Supremo N°123
Control Externo New York State PT Program - Biomonitoring Trace Elements
Método: Espectrometría de masas (ICP/MS)

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).