Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Parvovirus B19 por PCR-RT

Información general

Código BK	PCRPARV
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	No aplica
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	Reacción en cadena de la polimerasa, tiempo real
Propósito del examen	Detección del virus Parvovirus B19 en caso de sospecha de infección por este agente patógeno
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre, líquido amniótico, cefalorraquídeo o médula ósea
Tipo de muestra requerida	Sangre total (EDTA), líquido amniótico, cefalorraquídeo o médula ósea
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo con EDTA
Estabilidad de la muestra	48 horas
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	No contaminar con heparina

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Heparina

Rango de referencia

Sensibilidad analítica: 800 copias/mL
Método: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR-RT)

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).