Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Molibdeno en orina aislada

Información general

Código BK	MOLIOA
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	3 días hábiles
Unidad de medida	ug/g creatinina
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	Espectrometría de masa
Propósito del examen	Determinación cuantitativa de Molibdeno en orina para detectar posible intoxicación.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	7 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	No ingerir agua previo a la toma de muestra
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Estabilidad de la muestra	7 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	Prohibir la ingesta de agua previa toma de muestra a lo menos 4 horas antes (mas de un litro)

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	Acido bórico (preservante)

Rango de referencia

	Edad, años	Rango, ug/g creatinina
Ambos sexos	0 - 3	25,0 - 300
Ambos sexos	4 - 12	20,0 - 250
Ambos sexos	13 - 16	13,0 - 150
Mujeres	17 o mas	13,0 - 150
Hombres	17 o mas	10,0 - 130

Creatinina en Orina Aislada, mg/dL

Hombres: 39,0 - 259

Mujeres: 28,0 - 217

Método: Espectrometría de masas (ICP/MS)

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).